

## Versuche - Auswertung

### konische Typen

2008

Betrieb	Gartenbau Heinze		Vorfrucht	Gründüngung		Aussaatumdatum:	11.06.2008		1. Beurteilung		13.10.08 (Laub, Schosser)										
verantwortlich	Thomas Heinze		Düngung	keine ca. 10kg kohlenaurer Kalk/Ar		Aufgangsdatum	nach ca. 12 Tagen		2. Beurteilung		16.10.08 (Erntebonitur)										
Standort	Lindewerra		Bewässerung	3 x je 10 ml		Anzahl Pfl./m²	100		3. Beurteilung												
Bodenart	50% Schluff, 30% Ton		Wiederholungen	2		Nettofläche qm	45-75 m² je Sorte		Kulturrende		Mitte Oktober										
Sorte	Herkunft/ Züchter	Uniformität (1=keine, 9=sehr uniform)	Laubmasse (1=sehr klein, 9=sehr groß)	Laubfarbe (1=sehr hell, 9=sehr dunkel)	Alternaria Laub (1=sehr gering, 9=sehr stark)	Anzahl Schosser	Laublänge (cm)	Laubfestigkeit (1=sehr gering, 9=sehr stark)	Rübenlänge (1=sehr kurz, 9=sehr lang)	Rübenform	Wurzelaabschluss (1=stumpf, 2=leicht spitz, 3=spitz)	Herzfarbe (1=heller als Rinde, 2=gleichfarbig, 3=dunkler als Rinde)	Grünköpfigkeit (1=sehr gering, 9=sehr stark)	Anfälligkeit für echten Mehltau (1=sehr gering, 9=sehr stark)	Laubmasse (g)	Laubansatz (1=sehr fein, 9=sehr grob)	Ertrag marktfähig (Anzahl/Gramm)	Ertrag zu kleine (Anzahl/Gramm)	Ertrag Sonstige (Platzer, Verwachsene, Beintige)	innen grün (1=nicht, 9=sehr stark)	Bemerkungen, allgemeine Beurteilung
Chantenay St. Marthe	eigene Selektion	7	6	2	4,5	0	49	6	siehe Bemerkungen	1,5	1 bis 2	4	n.n.	2685	6	69 / 6503	30 / 585	7 / 746	5	konisch, mittellang bis kurz, mitteldick, nicht bauchig oder füllig, oben breit/rund, unten leicht eingefallen, äusserlich am dunkelsten orange, innen leuchtend hell	
Chantenay Royale	King	5	6,5	3	5	1	37	5,5		2	2 bis 3	3	n.n.	2037	4	104 / 7404	99 / 1732	12 / 678	4	konisch bis leicht konisch, mittellang bis kurz, länger und schlanker als Chantenay St Marthe und Red Core, unten etwas spitzer als letztere, rel rillig, häufig im unteren Teil eingedrückt, innen hell, rel helles Kambium	
Chantenay Rex	Ramiro	4	6	3	4	1	40	7		2	1 bis 2	5	n.n.	1637	4	72 / 5171	16 / 292	20 / 1975	8	überwiegend fast zylindrisch, mittellang und eher schlank, 1/3 leicht konisch bis konisch und mitteldick, unförmig, z.T. unten spitz, z.T. abfallende Schultern, blasse Farbe aussen wie innen, helles Kambium	
Chantenay Red Core	eigene Selektion	6	7	3	4	0	53	6,5		2	1 bis 3	3	n.n.	2848	6,5	68 / 5339	59 / 1373	8 / 551	6	konisch, mittellang bis kurz, etwas bauchiger als St Marthe, z.T. etwas walzenförmig und dick, innen hell	
Kuroda	Sakata	5,5	7	1	4	14	43	6		1,5	3	2,5	n.n.	2354	3,5	98 / 7387	26 / 530	27 / 3246	3	viele Geplatze, überwiegend fast zylindrisch, mittellang und mitteldick bis schlank, z.T. leicht konisch oder zylindrisch; sehr glatte Haut!, äusserlich leuchtend orange, innen tief dunkelorange	