



## Pflanzenbonitur

Betrieb	Maassaaten	Pflege und Bewässerung	1 x bewässern 3 x hacken Hormmist Hornkiesel	Aussaat	10. 5; Nachsaat 21.5.: Frühbusch und Virginia 3	Anzahl Wiederholung	2	Witterung	trockenes Frühjahr, regenreicher Sommer, langer trockener milder Spätherbst						
verantwortlich	Annette Maaß	Düngung	Mistgabe im Frühjahr	Pflanzung	6. Jun, 20. Jun	Anzahl Pfl. / Wiederholung	5								
Standort	Holste			Bonitur	zwischen 24.Jul u. 21.Aug	Pflanzenabstand	1 m								
Bodenart	humoser Sand			Ernte	zwischen 8.Jul u. 3.Aug	Parzellengröße	5 m²								
		Bonituren im Bestand nach 4-wöchiger Ernteperiode										Pflanzengesundheit			
Sorte	Herkunft/ Züchter	Verzweigung (1= unverzweigt, 9= sehr stark verzweigt)	Ranken (1= fehlend, 9=sehr stark)	Zugänglichkeit zu den Früchten (1=völlig unzugänglich, 9=ganz offen)	Blattstellung (1= ganz aufrecht, 9= ganz waagrecht)	Blattstielänge (1= sehr kurz, 9= sehr lang)	Blattgröße (1= sehr klein, 9= sehr gross)	Blattfarbe (1=sehr hell, 9=sehr dunkel)	Silberflecken (1=keine, 9=sehr stark)	Einschnitte der Blattspreite (1=fehlend, 9=sehr tief)	Einheitlichkeit (1=nicht einheitlich, 9=sehr einheitlich)	Echter Mehltau ( 24. Juli ) (1=fehlend, 9= sehr stark)	Sonstige Erkrankungen, Ringförmige Blattflecken (1=fehlend, 9= sehr stark)	Echter Mehltau ( 21. August ) (1=fehlend, 9= sehr stark)	Sonstige Erkrankungen, Randen (1=fehlend, 9= sehr stark)
		Zuboda	Referenzsorte	1	2,5	6	4	7	8	7	8	5	7,5	1	1
Dandoo F1	Referenzsorte	1	3	8	4	6,5	6	7,5	8	6,5	7,5	3	1	5	1
All Green Busch	Thompson & Morgan (GB, 2005)	5	2,5	4,5	4,5	6,5	6	6	5,5	5	2,5	3,5	1	7	2
Black Beauty	Reinsaat	1	2	7	5	6	6	6	5	6,5	6	2	1	5	1,5
Frühbusch	Select (CH)	1	2	5,5	6,5	5,5	5,5	5,5	4,5	3	3	1	1	5	1,5
Genovese	Robinsons (GB, 2005)	1	2	8	8	6	6,5	6,5	8	9	7	2	1	7	1
Striato d Italia	Sperli (D, 2005)	1	2,5	6,5	5	5,5	5,5	5,5	1,5	8	7	2,5	1	7	1
Verde D Italia	Franchi (I, 2005), semaille.com (F, 2006)	1	2	7	4	7	6	6	3	6,5	4	2	1	4,5	1
Verde mata compacta	Rocalba (E, 2005)	1	2,5	6,5	4	8	8	7	6	4,5	6	3,5	1	5,5	1
Virginia 3	Rocalba (E, 2005)	1	2	4,5	6	5	6,5	6	1	3	6,5	1,5	1	4	1

Betrieb	Maassaaten	Pflege und Bewässerung	1 x bewässert, 3 x hacken, Hornmist, Hornkiesel	Aussaattermin	10. Mai, Nachsaat: 21.5. Sorte Frühbusch und Virginia 3	Anzahl Wdhl.	2	Witterungsbedingungen							
verantwortlich	Annette Maaß	Düngung	Mistgabe im Frühjahr	Pflanzung	6. Jun, 20. Jun	Anzahl Pfl. / Wdhl	5	trockenes Frühjahr, regenreicher Sommer, langer trockener milder Spätherbst							
Standort	Holste			Bonitur	zwischen 24.Jul u. 21.Aug	Pflanzenabstand	1 m								
Bodenart	humoser Sand			Ernte	zwischen 8.Jul u. 3.Aug	Parzellengröße	5 m <sup>2</sup>								
Sorte	Herkunft/ Züchter	Fruchtbonitur (während der Haupternteperiode)						Ertragserhebung (Erntedauer variiert von Sorte zu Sorte, Wert errechnet aus Durchschnittserträge pro Erntegang)			Sensorik				
		Fruchthalslänge (1=sehr kurz, 9= sehr lang)	Brechbarkeit (1=sehr schlecht, 9=sehr gut)	Fruchtförmigkeit (1=kugelf., 2=bimant., 3=verjüngt-ellipsoid., 4=ellipsoid., 5=zylindrisch, 6=verjüngt-zylindrisch)	Verhältnis Länge/ max.Durchmesser (1=sehr klein, 9=sehr gross)	Fruchtfarbe (beschreibend)	Sonstiges (beschreibend was auffällt, z.B. Fruchtrippeln oder -furchen o.a.)	Anzahl Früchte von 10 Pflanzen	Gewicht Früchte von 10 Pflanzen in kg	Erntebeginn	Süße	Bitterkeit	Aroma-Ausprägung	Ausgewogenheit/Beliebtheit des Aromas	Geschmack beschreibend
Zuboda	Referenzsorte	5,5	6,5	5	6	glänzend dunkelgrün, klein marmoriert mit Flecken	gut brechbar, unregelmäßiger Ansatz,	7	2	8	6	1	sehr harm. Rund, nussig, gurkig	8	gurkig, nussig,kräftig,süß, kaum Belagbildung,sehr angenehm
Dandoo F1	Referenzsorte	7,5	8	5	7	dunkelgrün mit gelblichem Glanz,, kleine Sprengel und Punkte	neigt zu vernarbten Verletzungen, etwas zäh beim Brechen, sehr frühe erste Blüten	14	3	8	6	1	nussig, vollmundig, gurkig	7,5	gurkig, nussig,lieblich, kaum Belagbildung, sehr gelbes Fleisch
All Green Busch	Thompson & Morgan (GB, 2005)	5,5	3,5	5	6,5	mittelgrün mit gelbl. Sprengel, viele Abweicher	stark abgesetzter Fruchthals, gut brechbar, Windbruchanfällig	13	3	8	4-7.	1	viel Varianz	3	von nussig süß bis belagbildend stärkehaltig, gurkiges Aroma
Black Beauty	Reinsaat	6	6	5	7	mittelgrün mit hellen Sprengeln,	verleiht leicht Fruchthals, gut brechbar,	12	3	8	6	1	süßes feines aber flaches Aroma	5	sehr feine Süße , etwas belagbildend, wenig Eigenaroma
Frühbusch	Select (CH)	2	5,5	2,5	3	hell-/dunkelgrün leicht streifig mit Sprengeln und Flecken		7	1	3	6	1	mild fruchtig, lieblich	7	fruchtig, lieblich, mild, kaum Belagbildung
Genovese	Robinsons (GB, 2005)	2	2,5	5	6,5	hellgrün mit deutlicher, heller Marmorierung und Flecken	starke Grat-/Schulterbildung, Blüte löst nicht, empf. bei Druck, schwer brechbar,zieht Fäden	15	3	8	4	2	Belag bild.,etwas muffig	2	zusammenziehend, Belag bildend, dadurch geschmacksschwach
Striato d Italia	Sperli (D, 2005)	1,5	4	5	8	schmalgestreift mit höherem Dunkelgrünanteil	neigt zu Verwachsungen, bricht leicht bei Kälte ab, frühe Blüten (heterogen)	15	4	8	4	1	gurkig, kräftig	5,5	die Belagbildung überlagert etwas den kräftigen Geschmack
Verde D Italia	Franchi (I, 2005), semaille.com (F, 2006)	2	3,5	5	8	hellgelb auf grün gestreift mit heller lebhafter Maserung	Früchte brechen oft, ertragsstark, eng am Stamm wachsend,schwer brechbar b.Kälte, sehr gut b.Sonne	15	3	8	5	1	gurkig,stärkehaltig, fad	5	eher etwas stärkehaltig statt süß,gurkiges Aroma
Verde mata compacta	Rocalba (E, 2005)	6,5	7	5	6,5	mittelgrün mit regelmäßigen gelblichen Sprengeln, sehr einheitlich	große Kelchstellen, sehr gut beerntbar, werden länger bei Sonne (oder Pollen ?)	15	4	7	7	1	süß,rund,lieb.	8	angenehmes Aroma, lieblich , süß, mit geringer Belagbildung
Virginia 3	Rocalba (E, 2005)	2,5	5	4	3	sehr helles grün mit enger feiner Marmorierung und Flecken	wenn größer, dann rippig, wenig druckempfindlich,	7	2	5	6	1	lieblich süß, Belagbil.	5	süßes, feines Aroma, zusammenziehende Belagbildung