

Betrieb	Ökozuchtgarten Reinsdorf	Bodenbearbeitung, Pflege und Bewässerung		Frühjahrsfurche, Saatbettkombination.2 x Hacken; keine Bewässerung	Aussaat	08. Jun	Anzahl Wdhl.	2	Witterungsbedingungen							
verantwortlich	Dr. Bernd Horneburg	Bodenbearbeitung, Pflege und Bewässerung		Frühjahrsfurche, Saatbettkombination.2 x Hacken; keine Bewässerung	Pflanzung	12. Jul	Anzahl Pfl. / Wdhl	50	Der Sommer brachte vergleichsweise wenige Niederschläge, aber viel schwüles Wetter mit hoher Feuchte direkt über dem Boden. Der Herbst war trocken und sonnig mit wenig und schwachem Frost kurz vor der Ernte.							
Standort	Uni Göttingen	Bodenbearbeitung, Pflege und Bewässerung		Frühjahrsfurche, Saatbettkombination.2 x Hacken; keine Bewässerung	Bonitur	26.Sep 27. Okt	Pflanzenabstand	33 x 33 cm								
Bodenart	toniger Lehm	Bodenbearbeitung, Pflege und Bewässerung		Frühjahrsfurche, Saatbettkombination.2 x Hacken; keine Bewässerung	Ernte	26. Sep	Parzellengröße	7m ²								
		Bodenbearbeitung, Pflege und Bewässerung		Frühjahrsfurche, Saatbettkombination.2 x Hacken; keine Bewässerung												
Sorte	Herkunft/ Züchter	Pflanze										Sensorik				
		Einheitlichkeit der Parzelle 1= sehr uneinheitlich, 9=sehr einheitlich	Färbung des Kopfes beschreibend	Kopfbildung Gesamtnote aus Häufigkeit und Stärke; 1=fehlend, 9=sehr stark	Stiz des Kopfes im Umblatt 1=nicht abgesetzt, 9=sehr gut abgesetzt	Gelber Blatttrand 1=nicht befallen, 9=häufigster/ stärkster Befall	Ringflecken 1=nicht befallen, 9=häufigster/ stärkster Befall	Fäulnis 1=nicht befallen, 9=häufigster/ stärkster Befall	Echter Mehltau 1=nicht befallen, 9=häufigster/ stärkster Befall	Erntereife 1=sehr früh, 9= sehr spät	Bemerkungen	Bitterkeit 1=fehlend, 9=sehr intensiv	Süsse 1=fehlend, 9=sehr süß	Bellebtheit 1= sehr unbeliebt, 9= sehr beliebt	Zartheit 1=grob, derb, 9=sehr zart	Bemerkungen
Leonardo	Hild (Referenzsorte)	8,5 / 7	rot	7,5 / 8	8,5 / 8	2 / 6	5 / 9	8,5 / 6	8 / 6	2 / -	mehr Mehltau festere Köpfe 50%; röter = fluffiger 50%	8	5	5	7	erst süß, dann bitter, zum Ende ätzend bitter
Palla Rossa 3	Rheinsaat (Referenzsorte)	7 / 8	rot, teils braun- grün	7,5 / 7	7 / 7	3,5	8 / -	8,5 / -	7 / -	1,5 -	bei viel Mehltau meist fertiger Kopf; sehr rot fluffiger Kopf	6	2	6	6	begleitende Süße; sanfter im Geschmack, alles
Rossa di Verona tardiva		8,5	grün mit roten Sprenkeln, rote Blattadern	1 / -	n.n.	8,5 / -	7,5 -	9 / -	9 / -	9 / -	mangoldartig	keine Ernte möglich				
Di Soncino	Franchi	8,5	grün, wenige rote Blattadern	1 / -	n.n.	7 / -	8,5 / -	9 / -	9 / -	n.n.	mangoldartig	keine Ernte möglich				
Palla die Fuoca	Ingegnoli	7,5 / 9	rot oder grün - rotgesprenkelt	7,5 / 9	7,5 / 8	3,5 -	7 / 9	8 / 6	8 / 6	2 / -	kleine Köpfe	7	2	3	7	durchgehender, gleichbleibender Geschmack
Catalogna del Veneto		9	grün	1 / -	n.n.	8 / -	8 / -	9 / -	9 / -	n.n.	mangoldartig	keine Ernte möglich				
Palla Rossa 6	Franchi	6,5 / 7	grün mit roten Sprenkeln	5 / 6	- / 7	6 / 5	8 / 6	9 / 9	9 / 7	6 -	mangoldartig; Kopf erst im Frühjahr?	5	5	6	5,5	nicht so süß am Anfang und bitterer am Ende
Pigna	Sais	8,5	grün	1 / -	n.n.	8 / -	9 / -	9 / -	9 / -	n.n.	Löwenzahnartig, mindestens 3 Schosser	keine Ernte möglich				
Rossa di Verona precoce	Semiorto.com (I, 2006)	8,5 / 7	grün, rot zw. Blattadern	3 / 4	- / 6	8 / 7	7,5 / 6	9 / 8	9 / 7	7 / -	mangoldartig; Kopf erst im Frühjahr?	6	3,5	3,5	7,5	am Ende bitter
Rouge de Chioggia	La Semiorto	7,5 / 8	rot-grün	2 / 5	- / 7	6 / 6	8,5 / 8	9 / 7	9 / -	7 / -	salatartig	5	3	4,5	7	gegen Ende mehr bitter und mehr süß
Rouge de Chioggia race Carmen	Clause	7 / 8	rot oder grünbraun	8 / 9	8,5 / 9	2,5 -	8 / -	7 / -	8 / -	1 / -		6,5	1,5	5	6,5	bitter, Nachgeschmack bitter
Spadona	La Semiorto	6,5	grün, vereinzelt leicht rote Blattadern	1 / -	n.n.	3,5 -	9 / -	8,5	8,5 / -	n.n.	mangoldartig; Krankheit Kräusel Note 7	keine Ernte möglich				

Zahl v.d. Schrägstrich: Bonitur am 26.9.; hintere Zahl: Bonitur: 27.10.

Betrieb	Ökozuchtgarten Reinsdorf	Bodenbearbeitung, Pflege und Bewässerung	Frühjahrsfurche, Saatbettkombination, 2 x Hacken; keine Bewässerung								Aussaat	08. Jun	Anzahl Wdhl.	2	Witterungsbedingungen			
verantwortlich	Dr. Bernd Homeburg		Pflanzung	12. Jul	Anzahl Pfl. / Wdhl	50	Der Sommer brachte vergleichsweise wenige Niederschläge, aber viel schwüles Wetter mit hoher Feuchte direkt über dem Boden. Der Herbst war trocken und sonnig mit wenig und schwachem Frost kurz vor der Ernte.											
Standort	Uni Göttingen		Bonitur	26.Sep , 27. Okt	Pflanzenabstand	33 x 33 cm												
Bodenart	toniger Lehm		Ernte	26. Sep	Parzellengröße	7m²												
Sorte	Herkunft/ Züchter	Ertragserhebung										Bonitur (geputzt und sortiert)						Bemerkungen
		Schosser %	Kranke %	ohne Kopfbildung %	zu locker %	zu klein (>80g) %	marktfähige Köpfe %	Kopfgewicht kg	Marktertrag je Parzelle à 100 Pfl. kg	Innenbrand 1=kein Befall, 9= sehr starker Befall	Bemerkungen	Färbung des Kopfes beschreibend	Kopffestigkeit 1=sehr locker, 9=sehr fest	Kopmgröße 1=sehr locker, 9=sehr fest	Form der Kopfbasis siehe Beiblatt	Kopfform beschreibend: flachrund, rund, hochrund, oval, jeweils oben flach oder spitz	Einheitlichkeit des Kopfes 1= sehr uneinheitlich, 9=sehr einheitlich	
Leonardo öko	Hild (Referenzsorte)	0	82	0	0	4	94	0,32	30	4	mehr Mehltau festere Köpfe 50%; röter = fluffiger 50%	weiße Blattadern, dann grün, dann rot	6	8	6	rund, einige oval	7,5	Fast alle kopfbildenden Sorten scheinen Innenbrand (Kalziummangel) gehabt zu haben (braun verfärbte Ränder der Blätter). Allerdings in einem Stadium, dass die Köpfe in der Regel durch starkes Putzen noch marktfähig gemacht werden konnten. Starker Umblattwuchs; ab mitte September starker Mehltaubefall.
Palla Rossa 3	Rheinsaat (Referenzsorte)	1	87	6	3	4	81	0,20	16	6	bei viel Mehltau meist fertiger Kopf; sehr rot fluffiger Kopf	rot, weiße Adern, einige grün neben Adern	6,5	4,5	6,5	rund bis oval, 30 % spitz oben	4	
Rossa di Verona tardiva		n.n.									mangoldartig	n.n.						
Di Sencino	Franchi	n.n.									mangoldartig	n.n.						
Palla die Fuoca	Ingegnoli	0	89	0	2	6	86	0,25	22	5	kleine Köpfe	schwarzrot, weiße Adern; 20% grünlich um Adern	7,5	6	5,5	von rund bis oval mit Spitze	5,5	
Catalogna del Veneto		n.n.									mangoldartig	n.n.						
Palla Rossa 6	Franchi	0	5	1	17	2	57	0,32	19	2	mangoldartig; Kopf erst im Frühjahr?	grün, rot, oder rot-grün gesprenkelt, weiße Adern	4	5,5	5	rund, oval, spitz, alles dabei	2,5	
Pigna	Sais	n.n.									löwenzahnartig, mindestens 3 Schosser	n.n.						
Rossa di Verona precoce	Semiorto.com (I, 2006)	0	2	75	20	0	7	0,40	3	2	mangoldartig; Kopf erst im Frühjahr?	rot, weiße Adern, grünlich unterer Rand der Blätter	5,5	6,5	3	oval	6	
Rouge de Chioggia	La Semiorto	1	8	40	0	1	57	0,27	15	2	salatartig	rot, einzelne mit grünen Sprenkeln	6	5,5	6	vorwiegend rund, z.T. spitz oder flachrund	6	
Rouge de Chioggia race Carmen	Clause	0	90	0	2	24	67	0,19	13	7		rot, weiße Adern	7	3,5	6	rund, 50% mit Spitze	3,5	
Spadona	La Semiorto	n.n.									mangoldartig; Krankheit Kräusel Note 7	n.n.						