

Betrieb	Thomas Heinze	Bonitur	Bestand: 14.10./ 25.10., Ertrag 25.10., 14.11., Kopfbonitur: 25.10., 22.11., Sensorik: 22.11.							Aussaat	9. Jun, 30. Jun	Anzahl Wdhl.	3	Witterungsbedingungen			
verantwortlich	Kornelia Becker									Pflanzung	15. Jul, 1. Aug	Anzahl Pfl. / Wdhl	50	In den Monaten Juni bis Mitte September herrscht ein sehr wechselhaftes, eher kühles Wetter mit immer wieder Schauern und Gewittern vor. Die Monate Oktober und November sind sehr trocken. Im November Fröste bis -6°C.			
Standort	Bingenheim									Pflege und Bewässerung	1x 20mm; 3 x hacken, Hommist, Hornkiesel	Pflanzenabstand	33 x 33 cm				
Bodenart	toniger Lehm									Ernte	25. Okt, 14. Nov	Parzellengröße	7m ²				
Sorte	Herkunft/ Züchter	Pflanze									Bemerkungen	Sensorik				Bemerkungen	
		Erntefähigkeit der Parzelle 1= sehr uneinheitlich, 9=sehr einheitlich	Färbung des Kopfes beschreibend	Kopfbildung Gesamtnote aus Häufigkeit und Stärke: 1=fehlend, 9=sehr stark	Sitz des Kopfes im Umblatt 1=nicht abgesetzt, 9=sehr gut abgesetzt	Gelber Blatttrand 1=nicht befallen, 9=häufigster/stärkster Befall	Ringflecken 1=nicht befallen, 9=häufigster/stärkster Befall	Fäulnis 1=nicht befallen, 9=häufigster/stärkster Befall	Echter Mehltau 1=nicht befallen, 9=häufigster/stärkster Befall	Erntereife 1=sehr früh, 9= sehr spät		Bitterkeit 1=fehlend, 9=sehr intensiv	Süsse 1=fehlend, 9=sehr süß	Beliebtheit 1= sehr unbeliebt, 9= sehr beliebt	Zartheit 1=grob,derb, 9=sehr zart		
Leonardo	Hild (Referenzsorte)	6	grün, vereinzelt rot	9	7,8	2,5	4	2,5	1	2,5	Es zeigte sich dass die am 9. Juni zusätzlich ausgesäte Wiederholung kaum früher reifte als die drei Wochen später ausgesäten Wiederholungen. Auch bei dieser frühen Wiederholung wurden die sehr späten Sorten (v.a. Rossa di Verona tardivo, aber auch Chioggia Emilia, Rouge de Chioggia und Rossa di Verona precoce), ebenso wie bei der späteren Aussaat, bis zum Frosteintritt im Herbst nicht vollständig reif.	8	3	4	4	knackig	
Palla Rossa 3, RS	Rheinsaat (Referenzsorte)	4,5	rot und grün	7	6,8	3,5	3,5	3,5	2	2		6	5	6	6		
Palla Rossa 3, Mora	SAIS (I, 2000)	5	grün und rot	8,3	6,5	3,3	4,5	2,5	1,5	2		5	4	6	6	knackig	
Palla di Fuoco	Ingegnoli	4,8	grün und rot	8,5	6,5	3	4,3	3	1	2		7	3	3,5	5	leerer Geschmack	
Palla Rossa 5	Petoseed	4,3	grün, vereinzelt rot	4,8	4	2	3,5	1,5	1	5		5	5	6	4	gutes Verhältnis von Süsse und Bitterkeit, blumig, blütig	
Chioggia Emilia	Gautier (F, 2004)	4,8	mehr rot als grün	5	4	3,5	3,8	4,5	1	5		4	5	5	6	etwas leer	
Rouge de Chioggia race Carmen	Clause	5	grün und rot	8,5	7,5	3,5	5	3	2	1,5		6	3	4,5	5		
Rouge de Chioggia	Semiorto.com (I, 2006)	4,5	grün und rot	4,5	3,5	2	3,5	1	1	6		4	5	6	6	buttrig	
Rossa di Verona precoce	Semiorto.com (I, 2006)	5,5	mehr grün als rot	3,8	2	1,5	3,8	1,5	1	7		8	2	3	2		
Rossa di Verona tardiva		5	überwiegend grün	1,5	0	1,5	3	1	1	9		Bildet bis Frosteintritt keine erntefähigen Pflanzen				n.n.	
Catalogna puntarelle di Gaeta	SAIS (I, 2000)	5	grün	1	0	2	3	1,5	1	0	Beiden Sorte haben löwenzahnähnl., grüne Blätter, bilden keine Köpfe. Ernteeorgane sind die schiessenden Stängel im jungen Zustand.				n.n.		
Catalogna puntarelle a foglia frastaglia	SAIS (I, 2000)	4,5	grün	1	0	1	2	1	1	0					n.n.		

Betrieb	Thomas Heinze	Bonitur	Bestand: 14.10./25.10., Ertrag 25.10., 14.11., Kopfbonitur: 25.10., 22.11., Sensorik: 22.11.		Aussaat	9. Jun, 30. Jun	Anzahl Wdhl.	3	Witterungsbedingungen									
verantwortlich	Kornelia Becker		Pflanzung	15. Jul, 1. Aug	Anzahl Pfl. / Wdhl	50	in den Monaten Juni bis Mitte September herrscht ein sehr wechselhaftes, eher kühles Wetter mit immer wieder Schauern und Gewittern vor. Die Monate Oktober und November sind sehr trocken. Im November Ernte bis -6°C											
Standort	Bingenheim		Pflege und Bewässerung	1x 20mm ; 3 x hacken, Hornmist, Hornkiesel	Pflanzenabstand	33 x 33 cm												
Bodenart	toniger Lehm		Ernte	25. Okt, 14. Nov	Parzellengröße	7m²												
Sorte	Herkunft/ Züchter	Ertragserhebung										Bonitur (geputzt und sortiert)						
		Schosser %	Kranke %	ohne Kopfbildung %	zu locker %	zu klein (>80g) %	marktfähige Köpfe %	Kopfgewicht kg	Marktertrag je Parzelle à 100 Pfl. kg	Innenbrand 1=kein Befall, 9= sehr starker Befall	Bemerkungen	Färbung des Kopfes beschreibend	Kopffestigkeit 1=sehr locker, 9=sehr fest	Kopfgrösse 1=sehr locker, 9=sehr fest	Form der Kopfbasis siehe Beiblatt	Kopfform beschreibend: flachrund, rund, hochrund, oval, jeweils oben flach oder spitz	Einheitlichkeit des Kopfes 1= sehr uneinheitlich, 9=sehr einheitlich	Bemerkungen
Leonardo	Hild (Referenzsorte)	0	0	1	1	1	97	0,34	33	1	etw./kaum Fäulnis	mittleres Rot, Adern weiss, z.T. grün	8	8	7	rund-hochrund, flach, vereinzelt oval	7	
Palla Rossa 3, RS	Rheinsaat (Referenzsorte)	0	6	2	4	2	85	0,24	21	1	etw. mehr/ viel Fäulnis	mittleres Rot, Adern weiss bis grün, meist genetzt, vereinzelt gesprenkelt	7	5,8	6,5	meist hochrund bis oval u. spitz, vereinzelt rnd-flachrund u. flach	5	wenig ansprechr. (Homogenität, Fäulnis, Grösse)
Palla Rossa 3, Mora	SAIS (I, 2000)	0	6	1	0	3	90	0,25	23	1	etw./ etw. mehr Fäulnis	hell bis dkilrot, Adern weiss bis grün, z.T. genetzt, vereinzelt gesprenkelt	6,3	6,5	5,8	meist hochrund bis oval, spitz o. flach, teilw. rnd-flachrund u. flach	5,3	
Palla di Fuoco	Ingegnoli	0	4	0	0	1	95	0,29	27	1	kaum/ etw. mehr Fäulnis	hell bis mittelrot, Adern weiss, z.T. grün, z.T. genetzt	7	7,3	6,3	oft rund-hochrund u. flach bis etw. spitz, teilw. oval, z.T. flach, z.T. spitz	5,5	recht schön
Palla Rossa 5	Petoseed	0	0	0	7	2	91	0,27	24	1	keine Fäulnis/ gut gesund	z.T. grün, z.T. rot mit weissen Adern, z.T. genetzt	6	8	6	hochrund, z.T. oval, meist spitz	4	recht grüne Köpfe
Chioggia Emilia	Gautier (F, 2004)	0	8	13	8	10	57	0,18	10	1	mehr Fäulnis	mittelrot, sehr weisse Adern	5	6	4,5	meist oval-hochrund u. flach	7	wenig kräftig, blass
Rouge de Chioggia race Carmen	Clause	0	7	0	1	4	88	0,22	19	2	mehr/ viel Fäulnis	helles Rot, weisse Adern, vereinzelt etwas grün	7	5,5	6,5	meist rund u. rel. flach, teilw. etw. flachrund o. hochrund, vereinzelt oval	6	viel Fäulnis, klein, schön rund
Rouge de Chioggia	Semiorto.com (I, 2006)	0	0	13	7	11	69	0,26	18	1	kaum Fäulnis/ gesund	rot, z.T. grün, weisse Adern	6	6,5	6	rund-hochrund, z.T. spitz, z.T. flach	5,3	
Rossa di Verona precoce	Semiorto.com (I, 2006)	1	4	8	3	6	77	0,19	15	1	keine Fäulnis/ gesund; insg. locker	mittel bis dunkelrot, starke weisse Rippe	4,5	7	5	oval, flach	5,5	Mangoldtyp
Rossa di Verona tardiva		n.n.										n.n.						
Catalogna puntarelle di Gaeta	SAIS (I, 2000)	n.n.										n.n.						
Catalogna puntarelle a foglia frastaglia	SAIS (I, 2000)	n.n.										n.n.						