



Betrieb	Thomas Heinze/ Kornelia Becker	Bonitur und Ernte	Bestand	15.08.	Aussaatdatum	16.05.	Anzahl wiederh.	2	Witterungsbedingungen							
verantwortlich	Kornelia Becker		Sensorik	23.07., 17.08.	Pflanzung	29.05.	Anzahl Pfl. / Wiederh.	5	trockener Frühsommer, danach regelmässiger Niederschlag							
Standort	Bingenheim		Mehltau Spätbefall	21.09.	Pflege und Bewässerung	3 x Hacken, 1 x Bewässern, 2 x Hornmist, 3 x Hornkiesel	Pflanzenabstand	1m								
Bodenart	toniger Lehm		Ernte	06.07. - 06.08.		Parzellengröße	8,75 m²									
Sorte	Herkunft	Bonituren im Bestand nach 4-wöchiger Ernteperiode										Pflanzengesundheit				
		Verzweigung (1= unverzweigt, 9= sehr stark verzweigt)	Ranken (1= fehlend, 9=sehr stark)	Zugänglichkeit zu den Früchten (1=völlig unzugänglich, 9=ganz offen)	Blattstellung (1= ganz aufrecht, 9= ganz waagrecht)	Blattstelllänge (1= sehr kurz, 9= sehr lang)	Blattgröße (1= sehr klein, 9= sehr gross)	Blattfarbe (1=sehr hell, 9=sehr dunkel)	Silberflecken (1=keine, 9=sehr stark)	Einschnitte der Blattspreite (1=fehlend, 9=sehr tief)	Einheitlichkeit (1=nicht einheitlich, 9=sehr einheitlich)	Sonstiges	Echter Mehltau, junge Pflanze (1=fehlend, 9= sehr stark)	Sonstige Erkrankungen, Ringförmige Blattflecken (1=fehlend, 9= sehr stark)	Echter Mehltau, ältere Pflanze (1=fehlend, 9= sehr stark)	Sonstige Erkrankungen, Rinden (1=fehlend, 9= sehr stark)
Dundoo F1	Kiepenkerl, Referenzsorte	4	5,5	3,0	5,0	7,5	7,5	7,5	5,0	6,0	7,0		1,5	1	4	6,3
Zuboda	Bingenheimer Saatgut AG, Referenzsorte	4	5,5	1,5	3,0	7,5	9,0	7,5	6,0	3,0	5,5		2,5	1	3,5	6,0
Cocozele	Bingenheimer Saatgut AG, Referenzsorte	3	4,5	2,5	3,5	7,0	5,5	2,5	4,0	6,0	4,5	verschiedene Typen	1,5	1,5	8,5	9,0
Albarello	Bingenheimer Saatgut AG, Referenzsorte	2	5,0	4,0	5,0	5,0	4,5	3,0	5,0	6,5	5,5	kleine Pflanzen	1	1	7	8,5
Zelena Tikvica	Arche Noah (A, 2011)	4	4,5	2,0	3,0	6,0	7,5	7,0	3,5	4,0	2,8	buschig und rankend	1,5	1,5	2,5	5,8
Verde mata comp.	Rocalba (E, 2005)	2	4,0	3,5	2,0	6,5	6,0	6,0	4,0	4,5	7,0		2,5	1,5	4,5	6,5
Black Beauty	Chrestensen (D, 2005)	3	4,0	4,5	4,5	6,5	7,0	7,5	4,0	4,5	4,0	eine Pflanze mit gestreiften Früchten	3	3,5	4	5,5
Verde d'Italia	Franchi (I, 2005)	2	5,5	8,0	8,0	7,0	4,5	5,0	1,0	8,5	6,5	z. T. verzweigte Pflanzen	1,5	1,5	5,5	7,5
Striato d'Italia	Sperli (D 2005)	1	4,5	9,0	8,0	7,0	4,0	6,0	1,0	8,5	8,5	eine größere Pflanze	1,5	1	3,5	6,3
Tapir	Moravo Seesd (CZ)	3	5,0	2,0	4,0	6,5	5,0	3,0	6,0	7,0	4,5	buschige und umgefallene Pflanzen	2,5	1,5	8	9,0

Fruchtbonitur, Ertrag und Geschmack

Betrieb	Thomas Heinze/ Kornelia Becker	Bonitur und Ernte	Bestand	15.08.	Aussaatdatum	16.05.	Anzahl Wdhl.								
verantwortlich	Kornelia Becker		Sensorik	23.07., 17.08.	Pflanzung	29.05.	Anzahl Pfl. / Wdhl								
Standort	Bingenheim		Mehltau Spätbe	21.09.	Pflege und Bewässerung	3 x Hacken, 1 x Bewässern, 2 x Hornmist, 3 x Hornkiesel	Pflanzenabstand								
Bodenart	toniger Lehm		Ernte	06.07. - 06.08.			Parzellengröße								
Sorte	Herkunft	Fruchtbonitur (während der Haupternteperiode)				Ertragserhebung			Sensorik						
		Fruchthalslänge (1=sehr kurz, 9= sehr lang)	Brechbarkeit (1=sehr schlecht, 9=sehr gut)	Fruchtförm (1=kugelig, 2= birnentf., 3=verlängert elliptisch, 4=elliptisch, 5=zy/indrisch, 6=verlängert zy/indrisch)	Verhältnis Länge/ max.Durch- messer (1= sehr klein, 9=sehr gross)	Fruchtfarbe (beschreibend)	Einheitlichkeit der Frucht (1= sehr einheitlich, 9= völlig uneinheitlich)	Anzahl Früchte von 10 Pflanzen	Gewicht Früchte von 10 Pflanzen in kg	Erntebeginn	Süsse (1= keine, 9= sehr süß)	Bitterkeit (1= keine, 9= sehr bitter)	Aroma-Ausprägung (1= sehr schwach, 9= sehr stark)	Ausgewogenheit/ Beliebigkeit des Aromas (1= sehr unausgewogen/unbeliebt, 9= sehr ausgewogen/beliebt)	Geschmack beschreibend
Dundoo F1	Kiepenkerl, Referenzsorte	6,5	8,0	5,5	7,0	dunkelgrün, glänzend, feine gleichmäßige Maserung	6,5	233	63	06.07.	3,5	1	4	3,5	"grün", säuerlich, flaches Aroma, aber stärker als Zuboda, unangenehmer Nachgeschmack, stumpf, "belegt", Extreme sind wie zurückgehalten
Zuboda	Bingenheimer Saatgut AG, Referenzsorte	5,0	6,0	6,0	6,0	mittelgrün, etwas grobe gleichmäßige Maserung	7,0	105	26	06.07.	6	1	3	7	nussig, süß, anhaltende Süße, lecker, rund, frisch, schwach, nicht unangenehm, etwas fischartig bzw. eiweißreich, wenig ausdrucksstark bez. freilassend
Cocozelle	Bingenheimer Saatgut AG, Referenzsorte	2,5	4,0	5,5	8,5	grün gestreift, mittelhell, grobe Maserung	5,8	137	37	06.07.	6	1	4	8,5	frisch, nicht so intensiv, etwas süß, aromatisch; für rohen Verzehr
Albarello	Bingenheimer Saatgut AG, Referenzsorte	3,0	1,5	3,0	6,5	hellgrün, feine Maserung, einheitlich	5,8	157	41	09.07.	3,5	1	4	6	mild, leicht nussig, etwas süß, typisch Zucchini
Zelena Tikvica	Arche Noah (A, 2011)	4,3	5,0	6,0	6,0	sehr dunkel grün, feine Maserung	6,0	98	23	06.07.	3	1	3	4,5	sehr mild, leicht "pilzig", nicht süß, zart, nicht ausdrucksstark, recht neutral, angenehm weil weniger intensiv aber es fehlt etwas Frische
Verde mata comp.	Rocalba (E, 2005)	4,5	5,5	6,0	8,0	mittelgrün, etwas grobe gleichmäßige Maserung, vereinzelt gelbgrüne Früchte	5,5	121	31	09.07.	6	1	5	6	frisch und fruchtig, scharf? Kresse? Etwas wässrig
Black Beauty	Chrestensen (D, 2005)	4,5	4,5	5,3	8,0	mittelgrün, etwas streifig, fleckig, vereinzelt grüngestreifte Früchte	5,0	97	25	06.07.	4,5	1	3	6,5	nicht so intensiv, schwach, unaufdringlich, etwas nussig hinterlässt einen unangenehmen Nachgeschmack
Verde d'Italia	Franchi (I, 2005)	2,0	5,0	5,0	9,0	grün gestreift, einheitlich dunkel, feine Maserung	5,8	173	59	06.07.	6	1	6	7	angenehm frisch, leicht süß und saftig, nussig, mild, gurkig, etwas kresseartig, nicht "fischig" typisch Zucchini, intensiv, ausdrucksstark; für rohen Verzehr
Striato d'Italia	Sperli (D 2005)	2,0	5,0	5,3	9,0	grün gestreift, ziemlich dunkel, einheitlich	6,3	162	51	06.07.	6,5	1	5	3	nicht so frisch wie Cocozelle, nicht "gurkig", ein leichter Pilzgeschmack, etwas "grasig",
Tapir	Moravo Seesd (CZ)	2,0	4,0	6,0	9,0	grün gestreift, hell, uneinheitlich	5,8	121	34	09.07.	7,5	1	5	5,5	sehr süß, lecker, etwas trocken, nicht "gurkig" leichter Kressegeschmack