

Betrieb	Gut Wulfsdorf	Pflege und Bewässerung	2 x Hacken, keine Bewässerung, Hornmist, Hornkiesel		Aussaat	08. Jul	Anzahl Wdhl.	2	Witterungsbedingungen										
verantwortlich	Christina Henatsch				Pflanzung	26. Jul	Anzahl Pfl. / Wdhl	50	Juli, August bis Mitte September sehr feucht – mit regelmäßigen Niederschlägen - und kalt, mit einzelnen warmen Tagen. Dann sehr trocken mit einem warmen, lichtreichen Oktober; November kalt und trüb.										
Standort	Ahrensburg bei HH				Bonitur	26. Okt	Pflanzenabstand	33 x 33 cm											
Bodenart	Sand				Ernte	26. Okt	Parzellengröße	7m <sup>2</sup>											
Sorte	Herkunft/ Züchter	Ertragserhebung									Bonitur (geputzt und sortiert)								
		Schosser %	Kranke %	ohne Kopfbildung %	zu locker %	zu klein (>80g) %	marktfähige Köpfe %	Kopfgewicht kg	Marktertrag je Parzelle à 100 Pfl. kg	Innenbrand 1=kein Befall, 9= sehr starker Befall	Bemerkungen	Färbung des Kopfes beschreibend	Kopffestigkeit 1=sehr locker, 9=sehr fest	Kopfgröße 1=sehr locker, 9=sehr fest	Form der Kopfbasis siehe Beiblatt	Kopfform beschreibend: flachrund, rund, hochrund, oval, jeweils oben flach oder spitz	Einheitlichkeit des Kopfes 1= sehr uneinheitlich, 9=sehr einheitlich	Bemerkungen	
Leonardo	Hild (Referenzsorte)	0	100	3	11	5	81	0,14	11,5	1		dunkellila	7-9	3	5-7	rund, leicht spitz	9		
PR Reinsaat	Rheinsaat (Referenzsorte)	0	69	13	19	17	44	0,15	6,6	1		dunkellila	7-9	3-5	5-7	rund-hochrund	6		
Palla Rossa 3, Mo	SAIS (I, 2000)	0	91	10	22	24	41	0,13	5,1	1		dunkellila	7-9	3-4	5-7	rund-hochrund	8		
Palla Rossa 6	Franchi	0	6	69	38	35	35	0,18	6,1	1		weiß-lila	4-8	4-8	3-5	rund-oval	5		
Palla Rossa 5	Petoseed	0	0	77	22	3	41	0,14	5,7	1		dunkellila -weiß	5-8	5-7	5	hochrund, leicht spitz	6		
Chioggia Emilia	Gautier (F, 2004)	0	55	44	36	25	14	0,09	1,3	1		dunkellila	3-7	3-7	5-7	flachrund	7		
Spadona	Mauser (CH, 2006)	Sorte gehört zu Chicorré, ist kein Radicchio																	
Di Soncino	Franchi	Sorte gehört zu Chicorré, ist kein Radicchio																	
Catalogna puntarelle di Gaeta	SAIS (I, 2000)	ca 20%	Alle Catalogna-Typen gehören zu den Schnitzichorien und besitzen löwenzahnähnliche Blätter; der Stängel schießt im späten Herbst (EndeOktober/Mitte November) noch hoch und kann dann als Fruchtorgan geerntet																
Pigna	SAIS (I, 2000)																		
Catalogna del Veneto	SAIS (I, 2000)	ca 20%																	
Catalogna puntarelle a foglia frast.	SAIS (I, 2000)	ca 20%																	