



Betrieb	Gut Wulfsdorf	Pflanzung und Bewässerung	2 x Hacken, keine Bewässerung, Hormmist, Hornkiesel								Aussaat	08. Jul	Anzahl Wdhl.	2	Witterungsbedingungen			
verantwortlich	Christina Henatsch										Pflanzung	26. Jul	Anzahl Pfl. / Wdhl	50	Juli, August bis Mitte September sehr feucht – mit regelmäßigen Niederschlägen - und kalt, mit einzelnen warmen Tagen. Dann sehr trocken mit einem warmen, lichtreichen Oktober; November kalt und trüb.			
Standort	Ahrenburg bei HH										Bonitur	26. Okt	Pflanzenabstand	33 x 33 cm				
Bodenart	Sand										Ernte	26. Okt	Parzellengröße	7m²				
Sorte	Herkunft/ Züchter	Pflanze									Bemerkungen	Sensorik				Bemerkungen		
		Einheitlichkeit der Parzelle 1= sehr un einheitlich, 9=sehr einheitlich	Färbung des Kopfes beschreibend	Kopfbildung Gesamtnote aus Häufigkeit und Stärke: 1=fehlend, 9=sehr stark	Stiz des Kopfes im Umland 1=nicht abgesetzt, 9=sehr gut abgesetzt	Gelber Blattrand 1=nicht befallen, 9=häufigster/stärkster Befall	Ringflecken 1=nicht befallen, 9=häufigster/stärkster Befall	Fäulnis 1=nicht befallen, 9=häufigster/stärkster Befall	Echter Mehltau 1=nicht befallen, 9=häufigster/stärkster Befall	Erntereife 1=sehr früh, 9= sehr spät		Bitterkeit 1=fehlend, 9=sehr intensiv	Süße 1=fehlend, 9=sehr süß	Beliebtheit 1= sehr unbeliebt, 9= sehr beliebt	Zartheit 1=grob, derb, 9=sehr zart			
Leonardo	Hild (Referenzsorte)	9	dunkellila	9	7	7	n.n.	7	7	2		7,5	2	2	3	sehr bitter bei wenig Süße		
PR Reinsaat	Rheinsaat (Referenzsorte)	6	dunkellila	6	6	6	n.n.	6	7	3		6	4,5	4	5	bitter und süß		
Palla Rossa 3, Mo	SAIS (I, 2000)	8	dunkellila	7	5	7	n.n.	7	7	2		4,5	3,5	5,5	5	bitter und süß		
Palla Rossa 6	Franchi	4	weiß-lila	4	5	3	n.n.	3	4	5		4	4,5	6,5	5	angenehm bitter und süß		
Palla Rossa 5	Petoseed	5	dunkellila -weiß	5	5	2	n.n.	2	2	6		4	4,5	5,5	5	angenehm bitter und süß		
Chioggia Emilia	Gautier (F, 2004)	7	dunkellila	5	6	3	n.n.	3	5	6		4	5,5	7	6	beste Sorte im Geschmack		
Spadona	Mauser (CH, 2006)	Sorte gehört zu Chicorree, ist kein Radicchio																
Di Soncino	Franchi	Sorte gehört zu Chicorree, ist kein Radicchio																
Catalogna puntarelle di Gaeta	SAIS (I, 2000)	Alle Catalogna-Typen gehören zu den Schnittzichorien und besitzen löwenzahnähnliche Blätter; der Stängel schießt im späten Herbst (EndeOktober/Mitte November) noch hoch und kann dann als Fruchtorgan geerntet werden. Die Bestände sind einheitlich; die Anzahl erntbaren Schosser am norddeutschenVersuchsstandort jedoch gering (10-20%).																
Pigna	SAIS (I, 2000)																	
Catalogna del Veneto	SAIS (I, 2000)																	
Catalogna puntarelle a foglia frast.	SAIS (I, 2000)																	