



## Sortenscreening Radies EHZ-Bank

Standort	Vorfrucht	Aussaat	Witterungsverlauf während der Vegetationszeit	Beginn d. Bonitur
Oldendorfer Saatzucht, Holste		11.04.	zunächst war es sehr kalt, später sehr warm. Dazu kam Regen in Form von z. T. heftigen Güssen und einige Graupelschauer.	30.05.
Boden	Düngung	Pflanzung		Ende der Bonitur
humoser Sand		Direcktsaat		einmalernte

**Bemerkungen zu  
Kulturverlauf, Kulturmaßnahmen,  
Krankheiten, Schädlingen  
und weiteren Auffälligkeiten der Sorten**

Es wurde eher dicht gesät und z.T. vereinzelt. Der Bestand war durchgehend mit einem Netz abgedeckt. Eine Zusatzberegnung war nicht notwendig. Alles Sorten litten unter den Witterungsbedingungen. Besonders lückig zeigten sich Flambo und Neckaperle, was auf das Wetter oder auf mangelnde Saatgutqualität zurückzuführen ist. Auch die hohe Pelzigkeit bei vielen der Sorten könnte mit den extremen Witterungsbedingungen zusammenhängen. Zur Auswertung wurden 4 lfd. m beerntet (zwei je Wiederholung) und 100 markfähige Radies pro Sorte auf die Kriterien Pelzigkeit, Glasigkeit und Innenverfärbung untersucht. Die Schosser wurden zum einen für sich erfasst, zum anderen aber auch teilweise als markfähig eingestuft so dass hier Knollen doppelt auftauchen können. Es traten keine erwähnenswerten Krankheiten im Bestand auf.



### Sortenscreening Radies EHZ-Bank

Standort: Oldendorfer Saatzucht, Holste

Sorte mit S-Nummer	Laub		Knolle		
	Länge in cm	Farbe 1-9; 1=hellgrün, 9=dunkelgrün	Form beschreibend	Farbabweichung in %	Durchmesser in cm
(Referenzsorte) <b>Sora</b>	16	8	rund	0	3,2
<b>S0541 Flambo</b>	15	6	zylindrisch	3	2,3
<b>S0535 Duett</b>	15	5	nicht einheitlich	15	2,5
<b>S0543 Flamboyant 3</b>	19	7	überwiegend zylindrisch	sehr uneinheitlich	2
<b>S0544 Flamboyant 4</b>	15	7	eiförmig	sehr uneinheitlich	ca 2,3
<b>S0582 Nekarperle</b>	12	8	rund	0	3
<b>S0610 Rodos</b>	15	6	rund	unter 1	3,5
<b>S0641 Stoplite</b>	15	7	rund	unter 1	3



### Sortenscreening Radies EHZ-Bank

Standort: Oldendorfer Saatzucht, Holste

Sorte mit S-Nummer	Ertrag												Geschmack Geschmack beschreibend	Bemerkungen
	Anzahl Pfl je m	Ernte Datum	Bundelfähigkeit 1-9; 1=nicht gut, 9=sehr gut	Marktfähige in %	zu kleine in %	Platzer in %	Sonstige in %	Schosser in %	Pelzigkeit in %	Glasigkeit in %	Innenverfärbung in %	Anbaueignung: 1=unmittelbar - 2=nach Bearbeitung - 3=garnicht geeignet		
(Referenzsorte) <b>Sora</b>	272	30.5	8	55	37	5	3	23	27	0	16	Ref.		
<b>S0541 Flambo</b>	115	30.5	7	65	13	0	22	34	45	0	10	ca 2	sehr mild	
<b>S0535 Duett</b>	110	30.5	7	80	11	0	9	10	35	0	80	3	zunächst angenehm mild, dann sehr scharf	
<b>S0543 Flamboyant 3</b>	164	30.5	7	31	40	1	18	26	66	0	42	2-3	fein würzig, leicht schaft bis scharf	
<b>S0544 Flamboyant 4</b>	244	30.5	7	43	52	0	5	35	68	0	30	3	würzig, oft herb im Nachgeschmack, unterschiedlich	
<b>S0582 Nekarperle</b>	84	30.5	8	58	30	9	2	13	35	0	35	2	angenehm mild, selten scharf	
<b>S0610 Rodos</b>	150	30.5	7	64	34	10	10	46	38	0	48	2	angenehm frisch, neigt zur Schärfe	
<b>S0641 Stoplite</b>	194	30.5	8	43	40	12	6	37	34	0	18	2	mild, unauffällig	