



## Sortenscreening Rosenkohl EZH-Bank

Standort	Vorfrucht	Aussaat	Witterungsverlauf während der Vegetationszeit	Beginn d. Bonitur
Walsegarten, Vornecke, Vatterode			Große Hitze und Trockenheit wechselte sich mit kühlen, sehr nassen Phasen ab. Die Witterungsbedingungen waren aussergewöhnlich ungünstig.	
Boden	Düngung	Pflanzung		Ende der Bonitur
Lehmig bis Tonig		17.06.		

<p><b>Bemerkungen zu</b></p> <p><b>Kulturverlauf, Kulturmaßnahmen,</b>  <b>Krankheiten, Schädlingen</b>  <b>und weiteren Auffälligkeiten der Sorten</b></p>	<p>Netzabdeckung und Beregnung bis in den späten September. Vor dem Ende der Vegetationsperiode waren nur Idemar und teilweise Darkmar erntereif. Nach längerem Dauerfrost wurden am 31.1.2017 die übrigen Sorten beerntet. Daher war eine Bestimmung der genauen Erntereife nicht möglich.</p>
---	---



### Sortenscreening Rosenkohl EHZ-Bank

Standort: Walsegarten, Vornecke, Vatterode

Sorte mit S-Nummer	Bestand				Rosenbildung				Bemerkungen
	Gleichmäßigkeit 1-9; 1=sehr ungleichmäßig	Standfestigkeit 1-9; 1=sehr wenig standfest	Bestandeshöhe in cm	Innenblattnekrosen 1-9; 1=keine	Gleichmäßigkeit 1-9; 1= sehr ungleichmäßig	Rosenfarbe 1-9; 1=hellgrün, 9=sehr dunkelgrün	Öffnung der Rosen (1-9; 1=garnicht)	Festigkeit bei Erntereife 1-9; 1=sehr locker	
(Referenzsorte) <b>Idemar</b>	6	6	40-60	1	7	6	3,75	7	
<b>S0221 Early Half Tall</b>	6,8	7,5	46-60	3,5	6	6	5,5	4,5 und 6	
<b>S0229 Seven Hills</b>	5,5	3	40-60	2	5	7	5,25	5 und 6	
<b>S0217 Long Island</b>	4,5	4,25	40-60	3	4	5,5	4,5	4-7	
<b>S2160 Darkmar 21</b>	4,5	4,5	40-60	ca 6	5	7	6,25	3,5	
<b>S0208 De Rosny</b>	4,5	5	40-60	2,75	5	6	6	5-8	
<b>S2159 Casiopea</b>	5,5	5	45-65	4,75	5,5	6	4,5	5,5	
<b>S0206 Bedford Winter Harvest</b>	3,5	5,5	40-60	7	3,5	6	7,75	3-6	starke Anthocyanfärbung der Blattstiele



### Sortenscreening Rosenkohl EHZ-Bank

Standort: Walsegarten, Vornecke, Vatterode

Sorte mit S-Nummer	Ernte			Geschmack		Bemerkungen
	Pflückbarkeit (1-9; 1=sehr schlecht)	Putzaufwand (1-9; 1=wenig)	Frosthärte 1-9; 1=sehr wenig	Aroma beschreibend	Beliebtheit beschreibend	
(Referenzsorte) <b>Idemar</b>	6,5	4	6,5	sehr mild, typischer geschmack	+	Die früheste Sorte im Bestand mit ansehnlicher Aberntequote. Auch nach langem Dauerfrost sehr schöne ansehnliche Röschen. Sehr guter Gesamteindruck
<b>S0221 Early Half Tall</b>	5,5	6	6	zu mild, eher unbeliebt	-	Röschenbildung inhomogen und meist eher klein bei mittlerer Internodiendichte. Einzelne Pflanzen haben einen sehr guten Besatz. Die Frosthärte ist sehr gut.
<b>S0229 Seven Hills</b>	5	5,5	4-6	mild, leicht bitter, nicht stark ausgeprägt	+	wüchsig. Die Röschenbildung ist uneinheitlich. Die Röschen sind sehr klein, die Sorte lässt aber gutes Ertragspotential ahnen. guter Gesamteindruck
<b>S0217 Long Island</b>	6	5	4-8	leicht süß, kohlig, recht mild, o. k.	++	Einige Pflanzen haben einen sehr guten Ertrag bei enger Dichte der Röschen und guter Größe. Insgesamt noch inhomogener Bestand. Guter Gesamteindruck.
<b>S2160 Darkmar 21</b>	5,5	6	3-5	gut, angenehm	+	Sehr uneinheitlich in Bestand und Rosenbildung. Rosen stehen dicht beieinander, sind aber oft nicht fest genug.
<b>S0208 De Rosny</b>	3 und 5	6	2-8	eher unbeliebt	-	Einige Pflanzen mit festen, dicht beisammenstehenden Röschen. Der Großteil des Bestandes hat aber wenig Röschenbildung und ist inhomogen.
<b>S2159 Casiopea</b>	8,5	5,75	2-8	aromatisch süß	+	Feste Röschen stehen sehr weit auseinander, lassen sich aber gut ernten und sind relativ frosthart. Die Röschenbildung ist aber inhomogen, viele bleiben locker. Die Sorte hat Potential
<b>S0206 Bedford Winter Harvest</b>	5	7	2-8	sehr mild, angenehm	+	Sehr inhomogen in der Röschenbildung, Wenig feste Röschen.